

Preparo para pHmetria do Esôfago em crianças

1. O exame deverá ser autorizado previamente pelo convênio (confirmar com o seu Convênio).
2. No dia do procedimento, após a passagem da sonda será necessária a realização de um Rx de tórax para conferir a posição do cateter. Verifique com o seu convênio qual o local mais próximo do SEDIG para a realização do mesmo e se precisa de agendar previamente.
3. **Suspender** o uso de medicamentos para o estômago **07 dias** antes de sua realização (Omeprazol, Pantoprazol, Ranitidina, Label, etc).
4. **Não usar** Bromoprida, Motilium os similares por **48 horas** antes deste exame.
5. **Poderá** fazer uso de antiácidos comuns (Ex.: Mylanta plus, Kolantil, Andursil, Pepsamar, Hidroxígel) até às 22 horas do dia anterior ao exame.
6. **Se o Médico solicitar que o exame seja feito em uso de medicamentos (Omeprazol, Pantoprazol ou similares) trazer o mesmo para ser tomado no consultório.**
7. Jejum de 4 horas antes do exame. Não pode tomar nem água.
8. Tomar banho na manhã do dia do exame, porque após a colocação do aparelho não poderá tomar banho de chuveiro ou banheira, pois o aparelho e os eletrodos são eletroeletrônicos e **não podem ser molhados de forma alguma.**
9. Comparecer ao Serviço de pHmetria com blusa de botão na frente ou bem folgada, para facilitar a colocação do aparelho (não vir com blusa de zíper).
10. Trazer o resultado da última endoscopia digestiva ou REED (se já realizados).
11. Trazer medição da altura recente da criança **pelo pediatra ou enfermeira.**
12. Vir com um ou dois acompanhantes, que possam responder pelo paciente, com idade mínima de 18 anos.
13. O paciente que reside no interior deverá permanecer em Belo Horizonte no dia do exame.
14. Chegar somente no **horário marcado.**
15. Tempo médio de permanência no SEDIG é de até 2 horas.